

Effets secondaires suite aux vaccins :

Votre enfant vient de recevoir des vaccins.

Ceux-ci peuvent entraîner des réactions qui sont en général peu gênantes mais peuvent être soulagées. `

Vaccins à 2, 3, 4 et 12 - 15 mois : Hexyon et Synflorix

Réaction possible dans les 24-48h pendant 48h :

- En cas de fièvre >38.5 ou état grincheux : perdolan ou dafalgan 1-4x/jour
- En cas d'induration au niveau du site injection : arnica

Vaccin buvable Rotavirus :

Possible diarrhée 2-3 jours : aucun traitement.

Vaccin 12 mois : RRO (MMR vax pro)

Parfois réaction après 7-15 jours :

- Fièvre (perdolan)
- Fine éruption (poitrine et haut du dos) : ne rien faire !
- Rhinoconjonctivite : soins locaux.

Vaccin 15 mois: Neisvac C

Réaction possible dans les 24-48h pendant 48h :

- En cas de fièvre >38.5 ou état grincheux : perdolan ou dafalgan 1-4x/jour
- En cas d'induration au niveau du site injection : arnica

Tétanos : rappel 5-6 ans (**Tétravac**), rappel adulte combiné (**Boostrix**)

Possibilité d'une réaction inflammatoire locale douloureuse 2-4j et fièvre.

- En cas de fièvre ou douleur : dafalgan +/- ibuprofène
- En cas d'induration locale : arnica

Cancer du col (Gardasil- Cervarix)

Possibilité d'une réaction inflammatoire locale douloureuse, d'asthénie et céphalées.

- En cas de fièvre et douleur : dafalgan +/- ibuprofène
- En cas d'induration locale : arnica